

Таблица 1

| Симптомы | До начала терапии РЕМЕНС n=689 p<0,01 | Спустя 5 нед. терапии РЕМЕНС n=689 p<0,01 |
|--|--|--|
| Нарушения менструального цикла. Синдром предменструального напряжения | | |
| Продолжительность менструального цикла (дни) | 39 | 31 |
| Длит-ть меноррагии при гиперполменорее (дни) | 8,5 | 4,9 |
| Наступление овуляции % | - | 33,6 |
| Боли внизу живота % | 93 | 63 |
| Боли в пояснице % | 78 | 38 |
| Головные боли % | 70 | 40 |
| Мигрени с тошнотой % | 38 | 8 |
| Снижение концентрации внимания % | 68 | 32 |
| Внутреннее напряжение % | 90 | 68 |
| Плаксивость % | 74 | 51 |
| Депрессивное состояние % | 63 | 44 |
| Бессонница % | 70 | 51 |
| Снижение либидо % | 28 | 11 |
| Уровень пролактина Мкг/л | 36,5 | 27,6 |
| Психометрические показатели QoL (баллы) | 50,3 | 60,7 |
| Эффективность терапии | - | 93,8 |
| Побочные эффекты | 0 | 0,1 |
| Климактерический синдром | | |
| Приливы % | 94 | 21 |
| Гипергидроз % | 84 | 23 |
| Приступы сердцебиения % | 90 | 50 |
| Головокружение % | 82 | 66 |
| Внутреннее напряжение % | 96 | 38 |
| Плаксивость % | 94 | 28 |
| Раздражительность % | 95 | 41 |
| Эмоциональная лабильность % | 93 | 41 |
| Дисфория % | 40 | 12 |
| Депрессия % | 81 | 27 |
| Бессонница % | 91 | 27 |
| Холестерин/триглицерины (моль/л) | 6,3±0,36/2,78±0,37 | 6,09±0,31/2,51±0,33 |
| Психометрические показатели QoL (баллы) | 41,6 | 53,8 |
| Эффективность терапии % | - | 97,2 |
| Побочные эффекты | 0 | 0,1 |